Allgemeine deutsche

Garten-Zeitung.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Frauendorf.

IV. Jahrgang. Nro. 6. 7. Februar 1826.

Seitdem die Gärtnerei auf allen Meeren reiset,
Seit uns Amerika sein Füllhorn aufgethan,
Und nun kein Welttheil mehr des Menschen Drang bekreiset,
Seitdem fing für dieß Fach ein neuer Abschnitt an.

Wer aus Amerika sein Gärtchen wünscht zu zieren,
Dem soll heut' unser Blatt dazu zu Diensten stehn.
Er darf nur seinen Wunsch nach Dresden addressiren,
Herr Gottlob Friedrich Seidel wird ihn gut versehn.

Inhalt: Verzeichniß von englischen oder nordamerikanischen Gehölzen. — Mein Treibhaus. —

Verzeichniß
von
englischen oder nordamerikanischen Gehölzen,

welche gegen sogleich baare Vorausbezahlung in Conventionsgelde oder hinlänglich sichere Anweisungen, in deren Ermanglung der Betrag bei der Versendung nachgenommen wird, zu haben sind bei

Gottlob Friedrich Seidel,
Handelsgärtner u. Eigenthümer
in Dresden, Wilsdruffer Vorstadt, Grünegasse No. 863 b (auch ist eine Einfahrt auf der Mittelgasse bei No. 839.)

NB. Bei der Addresse sind vorzüglich die Vornamen genau auf den Briefen zu bemerken.

Zeichen: Die mit * empfehlen sich ganz besonders, die mit ⊛ und † sind noch vorzüglicher. Die mit § stehen beim Eigenthümer ganz unbedekt, und werden nur in kälteren Klimaten, oder höchstens einige Rhododendron und Azaleen, ihrer Blüthen halber, wenn diese aufbrechen wollen, einer Deke bedürfen. Die mit §§ brauchen nur eine leichte Laubdeke. Die mit §§§ aber verlangen eine sorgfältigere, jedoch keineswegs kostspielige Bedekung. Die ganz ohne Zeichen stehen im freien Lande. r bedeutet rankende.

	Thlr.	gr.
Acer creticum, A. trilobum, Lam.	—	8
— dasycarpum, Ehrh.	—	8
— hybridum, Willd.	—	8
— laciniatum, A. crispum, Lauth. ⊛	—	16
Acer Negundo	—	8
— nigrum, Mich.	—	8
— pensylvanicum, du Roi A. spicatum, Lam.	—	8
— saccharinum	—	8
Acer sempervirens?	—	8
— striatum, du Roi non pensylvanicum ⊛	—	8
— tartaricum	—	8
Aesculus carnea, nova Sp. ⊛	—	16

	Thlr.	gr.
Aesculus lutea, Wangh. Pavia flava, Mönch.	—	6
— macrostachya, Mich. A. nana Desf. ⊛	—	16
— Pavia, L. Pavia rubra, Lam. ⊛	—	16
Ailanthus glandulosa, Ait.* sehr groß	1	8
— — kleinere	—	16
Alnus serrulata, Willd.	—	16
Amorpha fruticosa	—	8
— glabra	—	8
— pubescens, Willd. A. pumila, Mich.	—	8
Amygdalus communis fragilis, Pers. Mandeln à la Princesse ⊛	—	8
— nana, Persica nana? Mill.*	—	4
— — chinensis?	—	6
— pumila plena, L. Prunus sinensis Desf. ⊛	—	6
Andromeda arborea	—	16
— axyllaris, Lam.	—	12
— calyculata latifolia, Ait	—	16
— Cassinefolia, Vent. ⊛	1	—
— catesbaei, Walt. A. Walteri, Willd.	—	16
— Daböcia §§ ⊛	1	—
— floribunda, Pursh.	—	16
— ligustrina? ⊛	—	16
— lucida, Lam. ⊛	1	—
— mariana ⊛	1	—
— paniculata	—	8
— polifolia, oleifolia ⊛	—	12
— speciosa, cassinefolia? ⊛	1	—
Arundo Donax §§	—	8
Aster argophyllos, Labill. §§ ⊛	1	—
— argenteus, Mich. A. sericeus, Vent. ⊛	—	8
Atragene alpina, Pall r.*	—	8
— florida, Pers. ⊛	1	8
Azalea alba, Ait. § ⊛	1	—
— coccinea? §	1	—
— glauca, Lam. § ⊛	1	—
— nudiflora § ⊛	1	—
— pontica A. arborea § ⊛ 1 bis	2	—
— — dergleichen kleinere	—	16
— tricolor?	1	—

	Thlr.	gr
Azalea viscosa § ⊛	1	—
Baccharis halimifolia	—	6
Berberis canadensis, Mill.	—	6
— chinensis, Poir? ⊛	—	16
— sibirica, Pall?	—	6
Betula fruticosa, Pall. B. quebeccensis	—	8
— lenta, L. nigra Duroy ⊛	—	8
— nana ⊛	—	6
— odorata, B. pubescens, Ehrh.	—	6
— papyracea?	—	6
— populifolia, Ait. B. acuminata, Ehrh.	—	8
Bignonia arborea caerulea? ⊛	—	8
— Catalpa	—	8
— grandiflora, r. §§ ⊛	—	16
— radicans ⊛	—	12
Calycanthus carolinianus? ⊛	1	—
— ferax ⊛	1	—
— floridus ⊛	1	—
— nanus ⊛	1	—
Camellia japonica, bis zu 1 Fuß hoch folgende Sorten:		
— alba plena §§§ ⊛	6	—
— carnea plena §§§ ⊛	3	—
— Grewille's red? §§§ ⊛	2	—
— longifolia §§§ ⊛	2	—
— Middelmist's §§§ ⊛	2	—
— paeoniflora §§§ ⊛	2	—
— pink coloured §§§ ⊛	3	—
— rubra plena §§§ ⊛	6	—
— — simplex §§§ ⊛	1	12
Dergleichen zum Veredlen als Wildstämme, 12 Stük für	12	—
— sasangua §§§	4	—
— semidouble §§§ ⊛	2	—
— striata plena §§§ ⊛	6	—
Ferner:		
— kewblush §§§ ⊛	8	—
— myrtifolia §§§ ⊛	8	—
— warratah, C. anemoniflora	10	—
— — alba §§§ ⊛	15	—
Größere Exemplare von 2, 4, 5 Ellen nach Verhältniß theurer.		
Carpinus virginiana*	—	12
Cassia marylandica ⊛	—	8

	Thlr.	gr.
Ceanothus Wendlandianus ⊛	—	8
Cephalanthus occidentalis ⊛	—	8
Cercis canadensis ⊛	—	8
Cestrum Parqui §§ ⊛	—	12
Chionanthus virginicus latifolius ⊛	2	—
Dergleichen kleinere von 16 gr. bis	1	—
Clematis canadensis r.*	—	4
— crispa r.*	—	8
— florida Thunb. r. ⊛	1	8
— glauca*	—	4
— erecta*	—	4
— integrifolia*	—	4
— viorna r.*	1	—
— Vitalba r.*	—	4
— viticella r.*	—	4
Clethra alnifolia ⊛	—	12
— acuminata? ⊛	—	16
Colutea arborescens	—	2
— Pocockii, Ait. C. halepica, Lam*	—	4
— cruenta, Ait C. orientalis, Lam. ⊛	—	16
Comptonia asplenifolia ⊛	1	—
Corchorus japonica †	—	6
Cornus alba, mit scharlachrothem Holz ⊛	—	6
— — fol. variegatis †	—	8
— alternifolia*	—	6
— circinata, l'ter. C. rugosa, Lam.*	—	8
— paniculata, Herit.	—	8
— sericea, Herit. C. amomum Mill.	—	6
— sibirica ⊛	—	6
— stricta	—	4
Coronilla Emerus.	—	4
Coryllus avellana maxima	—	4
— americana	—	8
— rostrata, Ait. C. cornuta	—	8
— tubulosa	—	6
Crataegus Aria suecica*	—	8
— Azarolus Aronia*	—	16
— coccinea, Willd	—	6
— corallina, H. Par. Cr. cordata, Ait.	—	8

	Thlr.	gr.
Crataegus Crusgalli splend. Ait. *	—	8
-- edulis. neu ⊛	—	16
-- glandulosa, Ait. sanguin. Pall.	—	8
-- glabra, Thunb. §§ ⊛ .	3	—
-- -- dergleichen große	5	—
-- indica, Ait. §§ ⊛ . .	1	—
-- oxyacantha fl. albo pleno medio rubro ⊛ . . .	—	16
-- -- -- subro ⊛	—	12
-- punctata, Ait	—	8
-- odoratissima, H. land. Cr. odorata, Bose . . .	—	16
-- tomentosa *	—	8
-- torminalis *	—	8
Cupressus sempervirens §§ .	—	8
-- thyoides * . 8 gr. bis	1	12
Cydonia japonica, Pers. Pyrus japon. Thunb., deſſen Blüthe iſt ſo ſchön als Granade †	2	—
-- chinensis Thuin. ⊛ . . .	—	16
Cytissus alpinus Willd. C. Laburn. latifol. Pers. ⊛ . .	—	8
-- austriacus *	—	8
-- Laburnum ⊛	—	8
-- nigricans ⊛	—	6
-- purpureus, Jacq. * . .	—	8
-- supinus, Jacq. * . . .	—	6
-- Species, an Robinia? ⊛	1	—
Daphne alpina	1	—
-- Cneorum ⊛	2	—
-- Mezereum	—	2
-- -- flore albo .	—	8
-- pontica, Andr §§. * .	1	—
Dianthus arboreus fl. pleno var. caryophyll.	—	12
Dieſe Nelke kann 10--12 und mehr Fuß hoch gezogen werden, und iſt dann ſowohl hochſtämmig, als an Spalieren mit ihren vielen Blumen ſehr ſchön. ⊛		
Dianthus fruticosus . .	—	4
Dyospyros Lotus ⊛ . . .	—	16
Erica herbacea †	—	8
-- procumbens? ⊛ . .	—	16
Evonymus atropurpureus, Jacq. *	—	8
-- europaeus	—	4
Evonymus latifolius, Jacq. ⊛	—	8
-- verrucosus, Jacq. * .	—	8
Fagus Castanea, Castanea vesca, Gärt.	—	8
-- pumila, Cast. pumila, Mill. nana, Duroi . . .	—	8
Fothergilla alnifolia, F. gardeni, Jacq. ⊛	1	—
Fraxinus alba, Bosc. Willd.	—	8
-- acuminata, Lam. Fr. concolor, Mich. . . .	—	8
-- aurea, Willd. ⊛ . .	—	8
-- caroliniana, Lam? Fr. lanceolata Borkh † . .	—	16
-- crispa, Willd. Fr. atrovirens, Desf. ⊛	—	8
-- epiptera, Mich. Fr. canadens, Gärt. discolor . . .	—	8
-- excelsior fol. arg. fimbriat varieg. ungemein ſchön † .	1	—
-- -- jaspidea, Desf. mit gelbgeſtreiftem Stamm .	—	8
-- -- pendula, Ait. . .	—	8
-- -- verrucosa, Desf. .	—	8
-- heterophylla, Vahl. Fr. monophylla, Desf. Fr simplicifol. Willd. ſehr großblättrig einblätterig, nicht die folgende, von der ſie ſich weſentlich unterſcheidet ⊛ . . .	—	8
-- microphylla monophylla, an Fr. lyrata? kleinblättrig einblättrig ⊛ . . .	—	8
-- -- rotundifolia H. Par? *	—	8
-- -- lancifolia, Fr. lentiscifolia, Desf. * . .	—	8
-- nana, Desf. Fr. polemonifol. Poir. ⊛	—	16
-- Ornus?	—	8
-- parvifolia, Willd. non Lam. nec lentiscifol. . .	—	8
-- polemonifolia, Poir .	—	16
-- pubescens, Lam. Fr. pensylvanica Marsh . . .	—	12
-- sambucifolia, Lam. Fr. nigra, Marsh.	—	8
Fraxinus salicifolia Zeyh. ⊛	—	16
-- viridis, Mich. * . .	—	8
Gautheria procumbens . .	—	4
Geniste florida §§ ⊛ . .	—	16
-- sibirica * . . .	—	6
Gleditschia inermis, Pers. .	—	8
-- -- dergl. ſehr groß	—	16
-- triacanthos .	—	8
-- dergleichen ſehr groß	—	16
Glycine frutescens, r. ⊛ .	—	16
Guilandina dioica ⊛ . 1 bis	2	—
Halesia tetraptera * . .	—	16
Hamamelis virginiana . .	—	16
Hedera quinquefolia . .	—	4
Hedysarum canadense. . .	—	4
Hibiscus palustris §§ ⊛ .	—	16
-- syriacus * . . .	—	8
-- -- caerulea plena §§ ⊛	—	16
Hippophaë canadensis? ⊛ .	1	—
-- rhamnoides . . .	—	8
Hydrangea arborescens * .	—	4
-- glauca, H. par. H. nivea, Mich. ⊛	—	8
-- quercifolia, Bartr. §§ ⊛ .	1	—
Hypericum Androsaemum .	—	4
-- Ascyron. . . .	—	6
-- calycinum ⊛ . . .	—	4
-- kalmianum ⊛ . . .	—	8
Jasminum fruticans § ⊛ .	—	8
-- grandiflorum §§ ⊛ . .	—	12
-- humile § ⊛ . . .	—	8
-- officinale § ⊛ . .	—	8
-- triumphans §§ ⊛ . .	—	16
Ilex aquifolium fol. variegatis ⊛	1	—
-- canariensis, Poir? . .	1	12
-- eclinata fol. varieg. Ilex ferox fol. varieg Ait. ⊛ . .	1	12
-- orientalis, J. dentatus ⊛	1	12
Itea virginiana ⊛. . . .	—	12
Iuglans cinerea . . .	—	16
-- compressa . . .	—	16
-- pyriformis . . .	—	16
-- regia mit weicher Schale .	—	8
-- sulcata	—	16
-- -- compressa . .	—	16

	Thlr.	gr.
Iuniperus phönicea, I. tetragona Mönch.	1	—
-- prostrata, Mich. I. repens?	—	16
-- Sabina . . 4 gr. bis	—	6
-- foliis variegatis .	—	12
-- suecica	—	16
-- tamariscifolia, Ait. .	—	8
-- virginiana . . .	—	16
Kalmia glauca Ait. § ⊛ . .	1	—
-- latifolia § ⊛ . . .	2	—
-- oleaefolia § ⊛ . .	2	—
-- pumila § ⊛ . . .	1	—
Koelreutera paniculata ⊛ .	—	16
Laurus Benzoin . . .	—	12
Ledum latifolium, Lam. ⊛ .	—	8
Lespedeza fruticosa, Pers. *	—	16
-- sessiliflora, Poir. § † .	1	—
Ligustrum lucidum, Ait. §§ ⊛	3	—
-- vulgare . . 2 gr. bis	—	4
Liriodendron tulipifera ⊛ 16 gr. bis	2	—
Lomatia silaifolia, Smith. §§§ ⊛	8	—
I. Lonicera Caprifolia, rankende.		
-- balearica, Decand. .	—	4
-- Caprifolium . . .	—	4
-- japonica, Thunb. ist wegen ihrer vielen und immerwährenden Blüthen, selbst an kleinen Pflänzchen in Töpfen sehr schön ⊛	—	8
-- Periclymenum . .	—	4
-- rotundifolia, Hortul. .	—	6
-- sempervirens, L. coccinea, Pers. ⊛	—	4
-- serotina, Ait. . . .	—	4
II. Chamäcerassi, strauchartige.		
-- alpigena ⊛	—	6
-- caerulea *	—	4
-- canadensis . . .	—	4
-- coccinea, Sp. nova, non Person ⊛ . . .	—	6
-- nigra *	—	6
-- pyrenaica ⊛ . . .	—	8
-- -- flore rubro ⊛	—	8
-- tartarica ⊛ . . .	—	4
-- Xylosteum . . .	—	4

	Thlr.	gr.
III. Lonicera Symphoricarpos.		
Symphoricarpos . .	—	4
Magnolia annonaefolia §§§ ⊛	3	—
-- fuscata, Andr. §§§ ⊛ . .	3	—
-- glauca § ⊛	5	—
-- Robus, Dec. §§ ⊛ . .	5	—
-- obovata, Thunb. §§. ⊛	1	—
Mespilus arbutifolia * . .	—	8
-- Cotoneaster *	—	8
-- grandiflora, Smith. * .	—	8
-- japonica, groß §§ ⊛ . .	2	—
-- odorata, M. odoratissima Andr.? ⊛ . . .	—	16
-- pyracantha ⊛ . . .	—	8
Morus nigra . . .	—	10
-- tartarica L. Pall. . .	—	8
Myrica Gale	—	8
Nandina domestica, Thunb. §§ ⊛	4	—
Olorapis angustifolia? §§ ⊛	1	—
Päonia Moutang, Sims. ⊛ 6 Thlr. bis	10	—
-- -- dergl. große bis	16	—
Phyladelphus coronarius ⊛ . 2 gr. bis	—	4
-- -- flore pleno	—	8
-- -- fol. varieg. †	1	—
-- tomentosus, P. grandiflor. Willd. * .	—	16
-- inodorus, L. non Hortul.	—	8
-- laxus, non grandiflorus	—	8
-- nanus, Mill. Desf. .	—	2
Pinus Abies, L.	—	4
-- alba, Ait. P. canadens. Duroi non Ait. ⊛	—	8
-- balsamea	—	8
-- canadensis Ait. non Duroi P. americana Duroi . .	—	8
-- Cedrus, Zeder von Libanon ⊛	2	—
-- lanceolata, Lamb. §§ ⊛	2	—
-- -- dergl. sehr groß † bis	5	—
-- mariana alba. P. alba?	—	8
-- maritima, Mill. ⊛ .	—	8
-- montana? . . .	—	8
-- Mughus, Jacq. P. Mugleo, Poir.	—	8
-- Pinaster, Ait. . .	1	—
-- Pumilio, Haenke . .	—	8

	Thlr.	gr.
Pinus resinosa, Ait. P. rubra, Mich. fils	—	16
-- rigaensis?	—	8
-- sorotina, Mich. P. Täda alopecuroides, Ait. . .	—	12
-- Strobus, ...	—	8
Populus candicans, Ait. .	—	8
-- canescens Dec. P. grisea, Desf.	—	8
-- dilatata, Ait. . . .	—	4
-- graeca, Ait. . . .	—	8
-- monilifera, Ait. carolinensis	—	4
-- nigra, Mich. P. hudsonia	—	8
Potentilla fruticosa . .	—	4
Prunus canadensis . .	—	8
-- Catesbaei ⊛ . . .	1	—
-- Chamaecerasus, Jacq. Pr. Ceras. fruticosus, Pall. *	—	8
-- dasycarpa, Ehrh. . .	—	12
-- Mahaleb, türkische Weichsel	—	8
-- nigra Ait?	—	8
-- Padus	—	8
-- -- rubra, Willd. .	—	8
-- pensilvanica, Ait. . .	—	8
-- pumila	—	8
-- serotina, Ehrh. Pad. serot. Borkh.	—	8
-- Sinensis, Desf. ⊛ . .	—	0
-- virginica, Padus rubra, Ait. non Wild	—	8
-- Punica granadum fl. pleno §§ ⊛	1	—
Pyrus baccata	—	6
-- coronaria, dessen Blüthe riecht vortrefflich . .	—	16
— dioica, Willd. P. apetala, Münch.	—	6
— elaagnifolia, Pall. P. nivalis *	—	8
— Malus cristall. sibirica, ächter sibir. Kristallapfel aus der Krimm ⊛	1	—
— Polliveria, Azerolbirne ⊛	—	8
— spectabilis, Ait. ⊛ .	—	12
— upsalensis . . .	—	8
Quercus Banisteri, Mich. ⊛	1	—
— falcata, Mich. Q. elongata, Willd. ⊛ . . .	2	—

	Thlr.	gr.
Quercus Prinos . . .	1	12
— Tauzin, Pers. Q. Toza, Bosc. ⊛ . . .	3	—
— — tomentosa ⊛ .	3	—
Rhamnus alpinus, L. * .	—	16
— frangula . . . ,	—	8
Rhododendron azaleoides, Desf. §. ⊛ . .	1 bis 2	—
— catabiense, Mich. § ⊛	5	—
— — kleinere . .	3	—
— crispum § ⊛ . . .	3	—
— dauricum § ⊛ . .	2	—
— maximum § ⊛ . .	2	—
— myrtifolium § ⊛ . .	2	—
— rotundifolium § ⊛ .	3	—
— — dergl. sehr groß .	4 bis 6	—
— striatum, R. aureo striatum	3	—
Rhodora canadensis ♄ ⊛ .	1	—
Rhus copalina, Copalfirnis ⊛	1	—
— Cotinus ⊛ . . .	—	8
— elegans, Ait. R. caroliniana Mill. ⊛	—	8
— glabrum . . .	—	8
— typhina	—	6
— vernix. chinès. firnis .	1	—
Ribes alpinum . . .	—	4
— aureum, Pursh. ⊛ .	—	8
— coccineum? nicht rubrum ⊛	—	10
— floridum, Herit. R. american, Mill. . . .	—	4
— — fol. variegatis .	—	4
— grossularia, siehe Stachel-Beeren-Verzeichniß im nächsten Blatte		
— nigrum	—	4
— petraeum, Jacq. ⊛ .	—	8
— rubrum	—	1
— — foliis variegatis .	—	6
— — fructu albo maximo .	—	2
— — — carneo maximo	—	2
Ribes sanguineum, Pursh ⊛	—	16
Robinia altagana, Herit .	—	16
— Caragana . . .	—	4
— Chamlagu, Herit. R. chinensis, Pers. ⊛ . .	—	16
— dubia, R. martinicensis Poir ?	—	16

	Thlr.	gr.
Robinia frutescens, L. Caragana digitata, Lam. ⊛ . .	—	16
— Halodendron L. Caragana argentea, Lam. ⊛ . .	1	—
— hispida, R. montana, Bartr. ⊛. . .	8 bis	— 16
— — dergl. hochstäm. in allen Größen bis zu 5 Ellen Höhe und Arm stark, mit schönen Kronen, sind nach Verhältniß theurer † . . .		
— inerims, Dum. R. umbraculifera, Dec. ⊛ .	8 bis	— 16
— — dergl. schöne Hochstämme mit Kronen nach Verhältniß theurer † . .		
— macrophylla, R. latifolia. Mill. ? ist neu . .	—	16
— — dergl. große nach Verhältniß theurer . .		
— mollis ? aus Samen erhalten ⊛	1	—
— Pseudo acacia .	4 bis	— 8
— sophoraefolia, Hort. Vind ⊛ . .	8 bis	— 16
— spectabilis . .	8 bis	— 16
— spinosa, L. R. ferox, Pall. ⊛	—	16
— stricta, nova, R. echinata. Mill?	—	16
— dergl. sehr große ⊛ .	1	—
— tortuosa, Dec. Trauer-Acacie ⊛. . . .	—	16
— — dergl. hochstämmige	1 bis 1	8
— viscosa	—	8
Rosa siehe Rosenverzeichniß im nächsten Blatte		
Rubus arcticus ⊛ . . .	—	8
— fruticosus fl. pleno r. § ⊛	—	8
— idaeus fructu albo maximo, weiße oder gelbe Riesenhimbeere von Chili ⊛ . .	—	4
— — — rubro dergl. rothe ⊛	—	2
— rosaefolius, Smith. flore pleno ⊛ . . .	1	—
Ruscus aculeatus . . .	—	8
— hyppoglossum . .	—	8

	Thlr.	gr.
Ruscus hyppophyllum . .	—	8
— racemosus. r. § ⊛ .	—	8
— salix babilonica, Trauer-Weide 4 bis	—	6
— Lapponum? S. daphnoides	—	4
Sambucus nigra fol. arg. var. ⊛	—	8
— — — aureo variegat *	—	8
— — — laciniatis	—	6
— racemosus, scharlachrother	—	4
Solanum dulcamara fol. aureo var. ⊛	—	6
Sophora japonica	16 gr. bis	1 —
Sorbus americana, Willd. ⊛	—	8
— aucuparia . . .	—	4
— — fol. variegatis .	—	8
— hybrida, L. Pyrus pinnatifida ⊛	—	8
— spuria, Pers. Pyr. hybrida. Mönch. * . . .	—	8
Spartium junceum ⊛ . .	—	8
— — dergl. sehr groß ⊛	—	16
Spiraea adiantifolia ⊛ . .	—	4
— alpina, Pall. ⊛ . .	—	6
— altaica, Pall. ⊛ . .	—	8
— aquilegifolia, Pall. ⊛ .	—	4
— Aruncus	—	4
— bethlehemensis? . .	—	4
— betulaefolia, Pall. * .	—	4
— chamaedryfolia * . .	—	4
— crenata	—	4
— filipendula flore pleno .	—	4
— hypericifolia ⊛ . .	—	4
— inflexa? * . . .	—	6
— laevigata, Sp. altaica, Pall. ⊛	—	8
— lobata, Murr. Sp. palmata ⊛	—	8
— oblongifolia, W. et Kit. *	—	4
— opulifolia . . .	—	4
— palmata, L. fils Sp. lobata ⊛	—	8
— salicifolia carnea, Ait. * .	—	1
— paniculata, Ait. Sp. alba, Ehrh.	—	2
— sorbifolia, Sp. pinnata, Mönch. * . . .	—	4

	Thlr.	gr.
Spiraea thalictroides, Pall. Sp.		
aquilegifol. ⊛	—	4
— tomentosa *	—	4
— trifoliata ⊛	—	4
— triloba	—	4
— Ulmaria	—	4
— — flore pleno †	—	8
Verschiedene Spiraeen im Rommel das Schok	1	—
Staphylea pinnata	—	8
Syringa chinensis, Willd. †	—	8
— persica †	—	4
— — flore albo †	—	8
— vulgaris, alba	—	2
— — caerulea *	—	2
— — rubra *	—	2
— — flore maximo ⊛	—	8
Tamarix germanica	—	8
Thea Bohea §§ ⊛	2	—
— longifolia, Th. Sasangua §§ *	2	—
— viridis, Th. cantoniensis §§ *	2	—
Thuja occidentalis	—	8
Tilia alba, Ait. T. argentea, Vent. ⊛	—	16
— americana macrophylla *	—	8
— corallina, Ait.	—	8
— pubescens, Ait.	—	8
Ulmus americana	—	8
— crispa	—	8
— effusa, Willd.	—	4
— monstrosa ⊛	—	16
— sibirica, Willd. Ulm. crenata, H. par *	—	8
— suberosa, Moench. Kork	—	4
Vaccinium amönum, Ait.	—	8
— Arctostaphyllos ⊛	—	8
— corymbosum	—	8
— macrocarpum r.	—	4
Viburnum acerifolium?	—	4
— edule, Pursh. V. Opulus edule, Mich.	—	16
— Lantana	—	6
— nudum	—	8
— odoratissimum? §§ ⊛	1	—
— Opulus roseum ⊛ 4 bis	—	6
Viburnum plicatum, Thunb. V. dentatum	—	4
— pyrifolium?	—	4
— sibiricum? ⊛	1	—
Vinca herbacea, W. et Kit. r.	—	2
— minor r.	—	1
— — fol. varieg. r. *	—	2
Vitis laciniosa	—	4
— riparia, Mich. V. odoratissima, Don.	—	4
— vinifera, siehe Verzeichniß der Weinsorten im nächsten Blatte.		
— virginiana, V. rubra?	—	4
— vulpina	—	4

☞ Da die Bestellungen nach der Ordnung expedirt werden, wie sie einlaufen, so bitte ich um baldigste Einsendung derselben, weil bei den späteren Eins oder das Andere verkauft seyn könnte.

G. F. Seidel.